

<有効な検査証明書として認められる要件>

検体

※現在、日本において、無症状者に対して検体として推奨しているもの。

○ **Nasopharyngeal Swab**
(鼻咽頭ぬぐい液)

○ **Saliva**
(唾液)

検査方法

※現在、日本において、無症状者に対して検査方法として推奨しているもの。

<核酸増幅検査>

○ **Nucleic acid amplification test (RT-PCR)**

核酸増幅検査 (RT-PCR法)

○ **Nucleic acid amplification test (LAMP)**

核酸増幅検査 (LAMP法)

○ **Nucleic acid amplification test (TMA)**

核酸増幅検査 (TMA法)

○ **Nucleic acid amplification test (TRC)**

核酸増幅検査 (TRC法)

○ **Nucleic acid amplification test (Smart Amp)**

核酸増幅検査 (Smart Amp法)

○ **Nucleic acid amplification test (NEAR)**

核酸増幅検査 (NEAR法)

<その他>

○ **Next generation sequence**

次世代シーケンス法

○ **Quantitative antigen test (CLEIA)**

抗原定量検査

検査時間

○ 検体採取が
出国前の72時間以内

<有効な検査証明書として認められない主な例>

※現在、日本において、無症状者に対して検体として推奨されていないもの。

× **Nasal swab** (鼻腔ぬぐい液)

× **Oral swab** (口腔ぬぐい液)

× **Throat swab** (咽頭ぬぐい液)

× **Mid-Turbinate Nasal swab** (中鼻甲介ぬぐい液)

× **Nasal and throat swab** (鼻腔・咽頭ぬぐい液)

× **Pharyngeal and nasal swab**
(咽頭・鼻腔ぬぐい液)

× **nasal and oropharyngeal swab**
(鼻腔・口腔咽頭ぬぐい液)

× **Gargle Water** (うがい液)

※現在、日本において、無症状者に対して検査方法として推奨されていないもの。

× **antigen**
(抗原検査)

× **antibody**
(抗体検査)

× 結果判明が
出国前の72時間以内

※今後、国内外の状況に鑑み、上記取扱いを変更する可能性があります。

参考：新型コロナウイルス感染症（COVID-19）病原体検査の指針第3.1版 (<https://www.mhlw.go.jp/content/000747986.pdf>)